

Sigmoideoskopi

Du er henvist til en kikkertundersøgelse af den nederste del af din tyktarm.

Forberedelse til undersøgelsen

KOST

De sidste 24 timer før og frem til undersøgelsen må du kun indtage tynde væsker fx klar suppe, sodavand, juice uden frugtkød, saftvand, kaffe og the uden mælk og lignende.

Husk at drikke rigeligt.

Du må ikke indtage mejeriprodukter.

Klyx – lavement

Klyx tages ca. 2 timer inden undersøgelsen. Man fjerner hættten på klyx, fører spidsen op i tarmen og tømmer indholdet ud. Herefter venter man 5-10 minutter hvorefter man går på toilettet.

Vi sender en rekvisition på et klyx på 240ml til dit apotek og du kan hente dette gratis.

Undersøgelsen

Med en bøjelig kikkert på tykkelse med en finger undersøges den nederste del af din tyktarm.

Undersøgelsen tager 5-10 minutter og er ofte forbundet med et vist ubehag.

Er undersøgelsen normal er det som oftest ikke nødvendigt at gøre yderligere. Eventuelt vil man blive tilbudt behandling af hæmorider hvis det skønnes at disse har været årsag til eventuel blødning.

Finder man polypper eller betændelse kan man tage prøver og det være nødvendigt efterfølgende at undersøge hele tyktarmen.

Du vil blive kontaktet af klinikken, når svaret på prøven foreligger.

Efterundersøgelsen og risiko

Du må spise og drikke som vanligt efter undersøgelsen.

Der er en meget sikker undersøgelse. Får man efterfølgende kraftige mavesmerter eller større blødning kan det være nødvendigt at kontakte klinikken, vagtlæge eller 1813.

Allergi, blodfortyndende behandling eller pacemaker.

Er du allergisk over for nogen medicin, får du blodfortyndende behandling eller har pacemaker bedes du oplyse dette til lægen ved undersøgelsen.