

Circumcision/omskæring

Du er henvist til circumcision/omskæring.

Du skal afsætte 40 minutter til indgrebet.

Før indgrebet

Du skal inden indgrebet fjerne hårene på pungen og ud til siderne.

1 til 2 timer før den aftalte tid skal du tage smertestillende medicin som anført neden for.

Indgrebet

Udføres i lokalbedøvelse. Du kan mærke berøringen men det bør ikke være smertefuldt.

Forhuden bliver syet sammen med tråde der forsvinder af sig selv i løbet af et par uger.

Smerter

Lokalbedøvelsen varer i 2-5 timer.

Ved forundersøgelsen lægges der en recept på tablet Ibuprofen 400 mg og tablet Panodil 500 mg.

Mod smerter må du tage 1 tablet Ibuprofen 400 mg og 2 tabletter Panodil 500 mg - op til 4 gange i døgnet.

Efter indgrebet

Du bør holde dig i ro/ligge de første 24 timer efter operationen.

Penis løftes op mod navlen. Læg fx et lille sammenrullet håndklæde under pungen.

Forbindingen fjernes efter 3 dage i forbindelse med et brusebad. Herefter skal såret vaskes og skylles godt med håndbruser 3 gange dagligt. Det duppes tørt med et rent håndklæde.

Karbad, svømmehal og lignende skal du vente med i 10 dage. Undlad hård fysisk aktivitet de første par dage.

Ved forhudsbevarende operation er det vigtigt at trække forhuden frem igen, da det modvirker hævelse.

Såret/penis vil være hævet i nogle uger efter operationen.

Du skal regne med at være sygemeldt en lille uges tid.

Kontrol i klinikken ved behov.

Komplikationer

Blødning og betændelse. Ved større blødning eller tegn på betændelse skal du kontakte læge.

Blodfortyndende medicin

Hvis du får blodfortyndende medicin, skal du holde pause med dette op til indgrebet. Pausens længde aftaler du med os.

Du skal holde 2 ugers pause med fiskeolie, hvidløgstabletter og lignende.